



Le dépistage du VIH : les tests rapides

On appelle test rapide, ou TDR (test de dépistage rapide), ou encore Trod (Test rapide à orientation diagnostique), "l'ensemble des dispositifs diagnostiques médicaux utilisables de façon unitaire ou en petite série permettant de donner un résultat rapide et qui ne nécessite pas de procédure automatisée."

La HAS (Haute autorité de santé) donne une définition plus spécifique dans le glossaire de son rapport sur le dépistage de l'infection à VIH en France. "Un test de dépistage rapide correspond à un test unitaire, à lecture subjective, de réalisation simple et conçu pour donner un résultat dans un délai court (moins de 30 minutes généralement) lorsqu'il est pratiqué auprès du patient. Il peut être réalisé sur sang total, salive, plasma ou sérum en fonction de la (les) matrice(s) revendiquée(s) par le fabricant pour son produit. Il permet la détection des anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2."

> In : [Dépistage de l'infection par le VIH en France, stratégies et dispositif de dépistage : synthèse et recommandations](#) (pdf, 338Ko) / HAS (Haute Autorité de Santé). - Octobre 2009. - P. 4.

Le reste de l'article en ligne sur le site du CRIPS (centre régional de ressources, d'information et de prévention sur le vih/sida) fourmille d'éléments. Voir le lien <http://www.lecrips-idf.net/article2361.html>.

Des photos et des liens aussi sur : <http://www.google.fr/search?q=trod&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=IQkJUrjJJ4Ld7QaEvIDQCA&ved=0CEMQsAQ&biw=1152&bih=704>